

# Cifo KS 64

## Potassio e zolfo a effetto immediato, a reazione acida

Migliora e uniforma le caratteristiche qualitative di frutta e ortaggi.  
Incrementa il contenuto di amido nella granella dei cereali.

**Con L-PROLINA**



**Componenti:** Potassio, L-prolina, acidi organici.

**Modalità d'azione e vantaggi agronomici:** CIFO KS 64 è un formulato appositamente studiato per apportare alle colture POTASSIO e ZOLFO in forma totalmente assimilabile.

L'innovativa formulazione, grazie alla reazione fisiologicamente acida e alla presenza di specifici carriers ad azione complessante-protettiva, è caratterizzata da una straordinaria capacità di assorbimento e traslocazione all'interno dei tessuti vegetali.

L'apporto di CIFO KS 64 nelle fasi più avanzate del ciclo colturale favorisce l'accumulo di zuccheri e fotosintetati nei frutti e nelle cariossidi dei cereali, incrementandone il valore commerciale.

CIFO KS 64 è arricchito inoltre con L-Prolina, amminoacido naturale particolarmente attivo nel contrastare stress idrico-salini e promuovere la colorazione di frutta e ortaggi durante le fasi di maturazione.

**Analisi e proprietà chimico-fisiche:**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Ossido di Potassio ( $K_2O$ ) solubile in acqua | 24% |
| Anidride solforica ( $SO_3$ ) solubile in acqua | 40% |

| pH 0.1% | EC 0.1% mS/cm | Densità g/ml |
|---------|---------------|--------------|
| 5.58    | 0.54          | 1.48         |

**Taglia:** 20 kg

**Metodo di applicazione: FOGLIARE**

| Colture                                 | Dose kg/ha                   | Indicazioni                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Piante da frutto, Vite e Olivo          | 3 - 5                        | Da ingrossamento frutto a maturazione ogni 7-10 giorni                        |
| Cereali e colture industriali           | 4- 6                         | Durante le fasi centrali e finali del ciclo colturale                         |
| Orticoltura in serra                    | 200-300 gr/hl                | Durante le fasi centrali e finali del ciclo, 2-3 trattamenti ogni 7-10 giorni |
| Orticoltura in pieno campo              | 3 - 5                        | Durante le fasi centrali e finali del ciclo, 2-3 trattamenti ogni 7-10 giorni |
| Colture floricole e ornamentali, vivaio | 200-250 gr/hl                | Durante le fasi centrali e finali del ciclo colturale                         |
| Tappeti Erbosi                          | 4 - 6 kg/1000 m <sup>2</sup> | Intervenire nel periodo estivo e prima della stasi invernale                  |

In applicazione fogliare si consiglia di utilizzare volumi di acqua, per singola applicazione, non inferiori ai 500-600 litri/ha su colture arboree, di 150-300 lt/ha su colture industriali ed erbacee da pieno campo, e di 80-100 litri/1000 mq su colture in serra.

**Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo-climatiche.**

**Miscibilità:** CIFO KS 64 è miscibile con i formulati CIFO alle dosi d'impiego suggerite in etichetta e con gli antiparassitari in genere, ad eccezione degli oli bianchi, degli insetticidi a base oleosa, dodina.

Evitare di aggiungere CIFO KS 64 a soluzioni molto acide (pH < 4). In ogni caso, si consiglia almeno una prova di miscibilità preliminare.